


Värskas järve mudas maardla

X = 6435185, Y = 717168



X = 6428295, Y = 710278

M 1:33601

kohaliku tähtsusega maardla

Maardla varud


Plokk	Pindala, ha	Paksus, m	aT, tuh.t	P, tuh.t	Kogu varu, tuh.t	Maavara
Kogu maardla	96,89				1069,3	järvemuda
1	25,96	4,6	340,3			järvemuda
2	50,46	4,6	670			järvemuda
3	20,47	1	59			järvemuda
4	49,43	2,4		343		järvemuda

Maavara kvaliteet

Kiht, plokk, väli	Tihedus g/cm ³	Tuhasus %	Looduslik niiskus %	Orgaanilise massi sisaldus, %
maardla	1,05	46,92	0,89	53,08

Kuni Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2005 määruseni nr 131 oli maardla üleriigilise tähtsusega. Järvemuda lõimis: üle 0.5mm - 0.2%, 0.5-0.1mm - 1.8%, 0.1-alla 0.001 - 98.0%.


Keskkonnakaitseks ja maakasutuslikud kitsendused Värskas maardlas



Maardla asub Lämmijärve Värskas lahes. Kasutamise korra väljatöötamisel tuleb arvestada Värskas farvateriga ja riikide vahelist tähtsust omava latika koelmuga. Tõugja (*Aspius aspius*) levikuala.




Keskkonnakaitse ja maakasutuslikud kitsendused Värskas maardlas



$X = 6431122, Y = 712824$


M 1:9009



X = 6429938, Y = 712942

M 1:9009


Kise turba ja järvemuda leiukoht



Lasunditüüpidest esinevad madalsoo- ja rabaturvas. Veel on välja toodud raba- sega ja alusturvas. Madalsoo turba varud on 29,2 tuh t ja rabaturbal 142,5 tuh. t.


Bilansiline järvemuda varu järve piires on 155,2 tuh. t ning prognoosvaru väljaspool järve 4,6 tuh. t. Füüsikaliste ja keemiliste omaduste poolest sobib järvemuda nii väetiseks kui ka koduloomade ja lindudele lisasöödaks.

Pabra järvemuda leiukoht



Järvemuda lasund katab kogu järve ulatuse, puudub vaid järve kirdeosas ~ 50 m laiuses kaldaäärses vööndis. Tuhasus suureneb lasundi alumises osas (keskmine 46,1%). Lubja ja raua sisaldus on madal (rauda keskm. 2,53%; CaO 3,52%), looduslik niiskus keskmiselt 88%. Järvemuda varu on hinnatud Pabra järve piires ja soosetetega kaetud läänekaldal 626 tuh.t. Soovitatakse jätta loodslikku seisundisse.

Preeksa turba ja järvemuda leiukoht




Kogu Preeksa järve järvemuda lasund on keskmise tuhasusega 28,3%, klastilis-orgaaniline ja orgaaniline, keskmise loodusliku niiskusega 90%. Lubja ja raua sisaldus on väike (rauda keskm. 2,14%, CaO 3,74%). Järvemuda varu järve piires on 13,8 hektaril 113,0 tuh.t.

Turba lasunditüüpidest esineb ala lääneosas madalsoo turvas ja kaguosas rabaturvas. Madalsoo turba lagunemisaste on 39% ja rabaturbal 36%. Hästilagunenud turba varud 32 hektaril on 185 tuh. t. Soovitatakse jätta loodslikku seisundisse.



Vaade Preeksa järvele.

Pullijärve järvemuda leiukoht




Kogu lasundi veesisaldus on suhteliselt kõrge(keskmine looduslik niiskus 92%), lubja ja raua sisaldus madal(rauda keskmiselt 1,23%, CaO 2,18%), keskmine tuhasus 35,7%. Jävremuda varu järve piires on 792 tuh.t. Soovitatakse jätta loodslikku seisundisse.



Vaade Pullijärvele.

Hino järvemuda leiukoht




Järvemuda lasund esineb 191,9 ha suurusel alal. Hino järve järvemuda lasund koosneb peamiselt väikese tuhasisaldusega vetikasest järvemudast. Loodusliku niiskuse sisaldus on peaaegu kogu lasundi ulatuses kõrge(94%), lubja ja rauda sisaldus madal(rauda keskm. 0,38%, CaO 2,76%), keskm. tuhausus 18,5%. Järvemuda varu järve piires on 828 tuh.t. Soovitatakse jätta loodslikku seisundisse.



Vaade Hino järvele.

Tobrova allikalubja perspektiivala



Allikalubja lasundit katab mõnekümne sentimeetri kuni meetri paksune huumusekiht. Lubjelasundis on CaCO_3 sisalduseks määratud 94-97 %. Käesolevaks ajaks võib lubja jääkvaru olla ligikaudu 40 tuh. m³.